

# **Perte auditive chez les enfants**

**Ce que tous les parents  
devraient savoir sur la perte  
auditive**

# Qu'est-ce que la perte auditive et la



Une personne malentendante ne peut pas entendre aussi bien qu'une personne qui a une audition normale.

La perte auditive peut :

- Être doux (peut entendre la plupart des choses) à profond (complètement sourd et ne peut rien entendre)
- Affecter une oreille ou les deux oreilles

Environ 466 millions de personnes dans le monde souffrent d'une perte auditive invalidante, dont 34 millions d'enfants

60 % des pertes auditives chez l'enfant sont dues à des causes évitables

## Quel est l'impact de la perte auditive chez les

Les bébés ont besoin d'entendre la parole afin de pouvoir développer leurs capacités d'écoute et de langage. Sans une intervention appropriée, les bébés sourds n'apprennent pas le langage et la parole, ce qui peut avoir un effet sur leurs progrès à l'école, sur le fait de se faire des amis et sur la recherche d'un emploi à l'avenir.



# Quelles sont les causes de la perte auditive chez les enfants ?



Infection pendant la grossesse  
Infection pendant l'enfance  
(rougeole, méningite, oreillons)



Jaunisse sévère chez le  
nouveau-né  
Manque d'oxygène à la  
naissance



Traumatisme à la  
tête ou à l'oreille



Bruits forts et  
continus (exemple :  
musique forte)



Infections récurrentes  
de l'oreille ou liquide  
dans l'oreille



Génétique :  
changements dans  
les instructions du  
corps



Utilisation de certains  
médicaments pendant la  
grossesse  
Utilisation de certains  
médicaments pendant l'enfance




Faible poids à la  
naissance

# Quand suspecter une perte auditive


## 0 – 3 mois

1. Ne réagit pas aux sons forts, au bruit et à la musique
2. Ne trouve pas les sons doux apaisants
3. À 2 mois, la voyelle ne sonne pas comme 'ooh'
4. À 2 mois, il ne devient pas silencieux quand les gens parlent




## 4 – 8 mois

1. Ne tourne pas la tête vers le son
2. Ne réagit pas aux changements de ton de la voix et aux différents sons
3. N'a pas d'intérêt pour les jouets qui font du bruit
4. Ne babille pas lorsqu'il joue ou pour répondre aux autres
5. À 6 mois, il n'essaie pas de copier les sons
6. Prêtez attention aux vibrations (parce qu'elles sont ressenties) plutôt qu'aux bruits



## 9 – 12 mois

1. Ne répond pas à son nom
2. Ne se tourne pas rapidement vers un son doux
3. N'a pas de hauteurs de voix différentes lors du babillage et ne produit pas de sons différents
4. N'écoute pas et ne rebondit pas sur la musique
5. À l'âge de 1 an, il ne dit plus de mots comme « maman » ou « papa »
6. Ne comprend pas les mots pour les objets et les personnes courants (exemple : eau, papa)
7. Ne répond pas à des mots et des phrases simples comme « Non », « Viens ici »



# Comment réduire les risques de Perte auditive



**Vaccinate children against  
childhood diseases  
Get vaccinated for diseases  
like rubella before pregnancy**



**Get proper medical care if  
your child has recurrent  
ear infections**



**Follow healthy ear  
care practices**



**Avoid  
infections/illness  
during pregnancy**



**Avoid the use of particular  
drugs which may be harmful  
to hearing**



**Have a healthy  
lifestyle during  
pregnancy  
including routine  
prenatal care**



**Reduce exposure to  
loud sounds**

# Que faire si vous pensez que votre enfant souffre d'une perte auditive ?

Apportez-les à votre clinique ou à votre médecin afin qu'un test auditif puisse être



N'attendez pas longtemps pour les emmener passer un test auditif. Plus tôt le problème d'audition est détecté, plus vite



## Interventions pour les enfants



Prothèses auditives et implants cochléaires



Apprentissage de la langue des signes



Orthophonie



Groupes de soutien pour les enfants et les familles

**L'intervention précoce est très importante** parce qu'elle permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les enfants.

Par exemple, les bébés dont la perte auditive est diagnostiquée à l'âge de 3 mois et dont l'intervention est mise en œuvre à l'âge de 6 mois peuvent développer la parole et le langage similaires à ceux de leurs amis ayant une audition normale

# Testez votre audition

Utilisez l'application HearWHO créée par l'Organisation mondiale de la santé pour tester l'audition de votre enfant et la vôtre. Cet outil de test convient aux enfants plus âgés et aux adultes.



Pour effectuer un test :

Téléchargez l'application depuis votre Google Play Store -  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hearxgroup.hearwho>

Téléchargez l'application depuis votre App Store --  
<https://apps.apple.com/us/app/hearwho-check-your-hearing/id1449966543?ls=1>

**Il s'agit d'une application de dépistage qui ne remplace pas un examen audiolgique médical approprié. Si vous échouez au test, prenez rendez-vous à votre clinique ou chez votre**



# Lutter contre la perte auditive et créer une vie meilleure pour vos enfants, parce qu'ils le

Créé par HI-Genes Africa

Traduit par : Gêné Clinik

